



“มะพร้าวน้ำหอม” (การปลูกและดูแลรักษา)

ครั้งที่ ๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด

แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร

เทศบาลตำบลยางหล่อ

ลักษณะประจำพันธุ์

มะพร้าวน้ำหอม จัดเป็นมะพร้าวกลุ่มต้นเดี่ยว ลำต้นมีขนาดเล็ก ใบสั้น กว้ามะพร้าวพันธุ์ไทยทั่วไป อายุการออกจั่นจะเร็ว ในปีหนึ่ง ๆ จั่นจะทยอยออกประมาณ ๑๕-๑๖ จั่น หรืออาจมากกว่านั้น ในแต่ละจั่นจะติดผลอยู่ระหว่าง ๑๐-๑๘ ผล ปัจจัยที่ทำให้มะพร้าวน้ำหอมให้ผลผลิตมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสภาพดิน แหล่งน้ำ สภาพอากาศ และการดูแลรักษา ฯลฯ



การเลือกสภาพพื้นที่ปลูกมะพร้าวน้ำหอม

๑. สภาพดินมีความอุดมสมบูรณ์สูง การระบายน้ำในดินดี
๒. ควรใกล้แหล่งน้ำ
๓. ฝนตกกระจายสม่ำเสมอ
๔. อุณหภูมิของอากาศอยู่ระหว่าง ๒๐-๒๙ องศา
๕. ปริมาณแสงแดดเฉลี่ย ๗.๑ ชม./วัน

ระยะปลูก

พื้นที่ราบทั่วไป แบบสามเหลี่ยม แบบสี่เหลี่ยมด้านเท่า ระยะ ๖.๐ x ๖.๐ , ๖.๕ x ๖.๕ เมตร สภาพที่ลุ่มน้ำไม่ท่วมขัง ปลูกแบบยกร่อง ใช้ปลูกแบบแถวคู่ และแถวเดี่ยว ระยะ ๖.๐ x ๖.๐ , ๖.๕ x ๖.๕ เมตร ระยะหลุมควรห่างจากขอบร่องน้ำประมาณ ๒ เมตร

การเตรียมหลุมปลูก

ควรเตรียมหลุมในช่วงฤดูแล้ง หากดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ขนาดหลุมควรกว้าง ๑.๐ x ๑.๐ x ๑.๐ เมตร แยกส่วนหน้าดินกับดินล่างออก ตากดินทิ้งไว้ ๗ วัน กั้นหลุมอาจรองด้วยเปลือกมะพร้าวช่วยในกรณีที่โครงสร้างของดินโปร่ง ระบายน้ำเร็ว หรือปริมาณน้ำไม่เพียงพอ นำส่วนของดินล่างผสมปุ๋ยคอก ๑ ปิบ ผสมหินหรือคอปอสเฟต ๒๐๐-๕๐๐ กรัม คลุกเคล้าให้ทั่วใส่กลบลงในหลุมปลูกจนเกือบเต็ม ทิ้งไว้จนถึงฤดูปลูก

วิธีการปลูก

หน่อพันธุ์ ควรตัดรากเดิมออกก่อนนำลงปลูกในหลุมที่ผสมดินใส่ไว้เกือบเต็ม ใช้ดินส่วนที่เหลือกลบหน่อพันธุ์ กดดินให้แน่นแต่ไม่ควรให้ดินกลบโคนหน่อ ซึ่งดินอาจรัดโคนหน่อ ทำให้การพัฒนาการเจริญเติบโตช้า



การดูแลรักษาสวนมะพร้าวน้ำหอม

การใส่ปุ๋ย

ปีที่ ๑ หลังปลูกมะพร้าวไปแล้ว ๔ เดือน เริ่มให้ปุ๋ยครั้งแรก โดยใช้ปุ๋ยเคมีสูตร ๑๓-๑๓-๒๑ , ๑๒-๑๒-๑๗-๒ อัตราต้นละ ๑ กก. + แมกนีเซียมซัลเฟต ๒๐๐ กรัม ครั้งที่ ๒ ใส่ในอัตราเดิมในช่วงปลายฤดูฝน

ปีที่ ๒ ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร ๑๓-๑๓-๒๑ , ๑๒-๑๒-๑๗-๒ อัตรา ๒ กก./ต้น/ปี แมกนีเซียมซัลเฟต ๓๐๐ กรัม/ต้น/ปี โดโลไมท์ ๑ กก./ต้น/ปี

ปีที่ ๓ ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร ๑๓-๑๓-๒๑ , ๑๒-๑๒-๑๗-๒ อัตรา ๓ กก./ต้น/ปี แมกนีเซียมซัลเฟต ๔๐๐ กรัม/ต้น/ปี โดโลไมท์ ๒ กก./ต้น/ปี

ปีที่ ๔ ขึ้นไป ใส่ปุ๋ย ๑๓-๑๓-๒๑ , ๑๒-๑๒-๑๗-๒ อัตรา ๔ กก./ต้น/ปี แมกนีเซียมซัลเฟต ๕๐๐ กรัม/ต้น/ปี โดโลไมท์ ๒ กก./ต้น/ปี

การใส่ปุ๋ยมะพร้าวน้ำหอม ให้แบ่งใส่ปีละ ๒ ครั้ง หว่านปุ๋ยรอบ ๆ บริเวณทรงพุ่มพรวนดินต้น ๆ กลบปุ๋ยรอบทรงพุ่ม (นอกจากนี้ ควรใส่เกลือแกง ให้มะพร้าว ๑.๕ กก./ต้น/ปี เพื่อเพิ่มธาตุคลอไรด์ ช่วยให้มะพร้าวติดผลดี และมีเนื้อหนา-ค้ำแน่นนำไปใช้กับการปลูกมะพร้าวพันธุ์ลูกผสมชุมพร-แต่ปรับใช้กันได้)

การให้น้ำ

น้ำ เป็นปัจจัยสำคัญต่อการทำสวนมะพร้าวน้ำหอมในฤดูแล้ง หากฝนทิ้งช่วงนานติดต่อกัน ๑-๒ เดือน ต้องมีการให้น้ำ

การกำจัดและควบคุมวัชพืช

ควรกำจัดวัชพืช จำพวกหญ้าคาและวัชพืชที่แย่งน้ำ แย่งอาหารอื่น ๆ บริเวณรอบโคนต้นให้หมด

การเพิ่มอินทรีย์วัตถุ

อินทรีย์วัตถุเป็นสิ่งจำเป็นเนื่องจากมะพร้าวน้ำหอมเป็นพืชที่ต้องการอินทรีย์วัตถุค่อนข้างสูง ควรใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ร่วมกับปุ๋ยเคมีอย่างน้อยปีละครั้ง หรือปีเว้นปี ขึ้นอยู่กับสภาพดินว่ามีความอุดมสมบูรณ์มากน้อยเพียงใด



การเก็บเกี่ยว

โดยทั่วไปหากมีการดูแลรักษาสวนที่ดีให้ปุ๋ยอย่างสม่ำเสมอ มะพร้าวจะออกจั่นเร็ว อายุประมาณ ๓ ปีเศษ ก็เริ่มทยอยเก็บผลผลิตได้แล้ว มะพร้าวน้ำหอมจะเริ่มเก็บผลอ่อนได้เมื่ออายุ ๗ เดือน หรือประมาณ ๑๙๐-๒๐๐ วัน น้ำมะพร้าวในระยะนี้จะหวานและหอม เนื้อจะนุ่มเหมาะต่อการบริโภค

“บริหารแบบธรรมาภิบาล ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่
เคียงคู่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างค่านิยมเศรษฐกิจพอเพียง”
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ๓๙๑๘๐
โทร. ๐๔๒-๐๐๓๒๕๕ โทรสาร. ๐๔๒-๐๐๓๒๕๓